

棘跗姬蜂属（膜翅目，姬蜂科）在中国首次发现并记述一新种

盛茂领 孙淑萍

国家林业局森林病虫害防治总站 沈阳 110034

摘 要 报道在河南省发现的我国新纪录属：棘跗姬蜂属 *Aconias* Cameron, 1904, 并记述 1 新种：褐棘跗姬蜂 *Aconias ruficoxalis* sp. nov.。编制了世界已知种检索表。

关键词 膜翅目，姬蜂科，棘跗姬蜂属，新种。

中图分类号 Q969.544.8

棘跗姬蜂属 *Aconias* Cameron, 1904 隶属于姬蜂科 Ichneumonidae 秘姬蜂亚科 Gryptinae 甲腹姬蜂族 Hemigasterini, 分布于古北区和东洋区, 目前仅知 4 种: 白棘跗姬蜂 *A. albitarsis* (Uchida, 1936), 分布于日本、俄罗斯; 凹棘跗姬蜂 *A. concavopropodeon* (Uchida, 1952), 分布于日本; 针棘跗姬蜂 *A. spinitarsis* Cameron, 1904, 分布于印度; 跗棘跗姬蜂 *A. tarsatus* (Bridgman, 1881), 分布于俄罗斯、拉脱维亚、奥地利、比利时、芬兰、德国、匈牙利、波兰、瑞典、瑞士、英国等。迄今为止, 我国尚无记载。本文记述采自河南省西峡县老界岭自然保护区的本属 1 新种。模式标本保存在国家林业局森林病虫害防治总站标本馆。

棘跗姬蜂属 *Aconias* **Cameron, 1904** 中国新纪录  
*Aconias* Cameron, 1904. Zeitschrift für Systematische Hymenopterologie und  
Dipterologie, 4: 345. Type species: *Aconias spinitarsis* Cameron.

前翅长 3.5~ 8.5 mm。唇基中部或近中部隆起, 端缘无缺刻。上颚长, 下端齿长于且宽于上端齿; 雌性的触角端部钝, 圆筒形。腹板侧沟伸达中足基节。小翅室五边形, 时间横脉平行; 第 2 回脉位于它的近中央。并胸腹节气门距侧纵脊较近, 距外侧脊远; 具侧突, 但较弱。腹部第 1 节背板较长, 背中脊不明显, 背侧脊完整。产卵器端部较长且尖, 腹瓣具弱脊。

全世界仅知 4 种, 分布于古北区和东洋区。迄今为止, 我国尚无分布纪录。寄主不详。

棘跗姬蜂属世界已知种 (♀) 检索表

1. 后足跗节具白色环 ..... 2
- 后足跗节无白色环 ..... 3
2. 颜面黑色; 后足胫节黑色, 仅基部带浅色 .....
- ..... 白棘跗姬蜂 *A. albitarsis* (Uchida)

- 颜面白色; 后足胫节红色, 仅端部黑色 .....
- ..... 跗棘跗姬蜂 *A. tarsatus* (Bridgman)
3. 腹部背板黑色, 基节黑色 .....
- ..... 凹棘跗姬蜂 *A. concavopropodeon* (Uchida)
- 腹部背板至少端半部褐色或红褐色; 基节褐色或黑色 .....
4. 颜面黑色; 前胸背板黑色; 翅痣黑色; 基节、转节黑色 .....
- ..... 针棘跗姬蜂 *A. spinitarsis* **Cameron**
- 颜面红褐色; 前胸背板前部红褐色; 翅痣褐色; 基节 (后足基节基部腹侧褐黑色)、转节褐色 .....
- ..... 褐棘跗姬蜂, 新种 *A. ruficoxalis* sp. nov.

褐棘跗姬蜂, 新种 *Aconias ruficoxalis* **sp. nov.** (图 1 ~ 4)

♀ 体长 3.5~ 7.5 mm。前翅长 3.0~ 6.5 mm。产卵器鞘长 1.3~ 2.5 mm。

颜面宽约为长的 2.2 倍; 中央隆起, 上缘中央 (触角窝之间) 宽浅凹; 粗糙, 不清晰的细粒状, 侧缘相对较弱。唇基约在中部 (中央稍下方) 横向隆起; 光滑光亮, 基部具非常稀且不均匀的刻点, 端部侧面具较弱的横纹; 端缘中段平截。上颚长, 上下缘几乎平行, 基部具刻点; 上端齿明显短于下端齿。颊区稍粗糙, 具细粒状表面, 后部具细刻点; 颞眼距约等于上颞基部宽。上颊具较稠密的毛刻点, 向后较弱的收敛。头顶微弱且均匀隆起, 后部由侧单眼向后头脊均匀 (稍呈弧形) 下降, 具非常稠密但不清晰的细刻点。单眼区稍隆起; 侧单眼间距约为单复眼间距 0.8 倍。额的下部凹陷, 凹陷区域内稍光滑, 上半部具革质状表面和非常不清晰的细刻点。触角粗壮, 基部较细, 端部稍粗, 鞭节 21~ 22 节, 第 1~ 5 鞭节长度之比依次为 8: 6: 5: 4: 3。后头脊完整。

前胸背板粗糙; 亚前缘具细纵纹; 侧凹内具非常不清晰且不规则的细皱; 后上部具非常弱的刻点。前沟缘脊非常短且弱。中胸盾片弱且均匀地隆起,




图 1~ 4 褐棘附姬蜂, 新种 *Aonias ruficoxalis* sp. nov.

1. 整体侧面观 (body, lateral view) 2. 颜面 (face) 3. 中胸侧板 (mesopleurum) 4. 产卵器端部 (apical portion of ovipositor)

具非常稠密而不清晰的细刻点; 无盾纵沟。小盾片稍隆起 (几乎平), 具较稀且清晰的刻点。后小盾片横向, 较低矮, 具非常稀的细刻点。中胸侧板具非常稠密的斜横皱纹; 上下缘具细刻点; 胸腹侧片稍粗糙, 刻点不清晰; 胸腹侧脊伸达翅基下脊 (上端较弱); 中胸侧板凹深横沟状; 腹板侧沟前半部深且清晰。后胸侧板前上部具多多少少清晰稠密的横皱, 后下部具不规则的网状皱。翅灰褐色透明; 小脉与

基脉对叉或位于它的稍外侧; 小翅室五边形, 肘间横脉几乎平行; 第 2 回脉在它的中央与之相接; 外小脉在中央稍下方曲折; 后中脉明显拱起; 后小脉垂直, 约在下方 1/4 处曲折。足基节近球形 (后足基节短锥形) 膨大; 后足基节具非常稠密且细的刻点, 第 1~ 5 跗节长度之比依次为 23 11: 7 4: 11。并胸腹节具稠密且不规则的短细皱; 端区具多多少少清晰的横皱; 外侧区在气门处稍凹, 后部具斜横皱; 端

横脊完整; 中纵脊存在, 但较弱; 侧纵脊和外侧脊相对较强壮; 并胸腹节侧突短但可见; 端区强度下斜呈弧形注; 气门斜椭圆形, 至侧纵脊的距离与距外侧脊的距离等长。

腹部背面观约呈纺锤形, 腹部最宽处位于第2节末端, 几乎光滑无刻点, 具非常短的褐色毛, 背面中部较稀, 侧面及后部较密。第1节背板狭长, 均匀向后变宽, 长约为端宽的2.2倍, 具微弱的细革质状表面, 背中脊不明显, 背侧脊较弱但完整; 气门非常小, 圆形, 稍凹陷, 约位于该节背板端部0.4处。第2节背板梯形, 长约为端宽的0.6~0.7倍, 最宽处约为基部宽的1.6~1.7倍, 基部两侧稍前伸。产卵器端部长且尖; 腹瓣端部具非常弱的脊, 基部(内侧)的2条相距较远, 并远离其它(端部的)脊, 内斜, 端部的脊较密且垂直。

头和胸部主要为黑色; 触角鞭节黑褐色, 末端腹侧红褐色, 第7(8)~11节黄白色; 触角柄节、梗节腹侧、颜面、唇基、上颚(端齿黑色除外)、下唇须、下颚须、前胸背板(后上角及后缘黑色)、翅基片、小盾片、并胸腹节后端两侧、足(后足基节腹侧基部褐黑色)、腹部(第1节背板中段带黑色除外)红褐至暗褐色; 翅痣褐色; 翅脉黑褐色。

♂ 体长5.5~10.0 mm。前翅长4.7~8.5 mm。触角长约等于体长; 鞭节28~33节, 触角瘤长椭圆形, 端部的较小且长, 位于鞭节第(13)14~(19)21节。后足跗节第2~4节浅黄色。

正模 ♀, 河南西峡老界岭自然保护区, 1550 m, 1998-07-17, 盛茂领采; 副模: 4♀♀, 1♂, 1998-07-18, 盛茂领、孙淑萍采, 其它记录同正模; 1♂, 河南嵩县白云山自然保护区, 1300 m, 1996-07-16, 申效诚采。

## DISCOVERY OF THE GENUS *ACONIAS* CAMERON (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) IN CHINA WITH DESCRIPTION OF A NEW SPECIES

SHENG Mao Ling, SUN Shu Ping

General Station of Forest Pest Management, State Forestry Administration, Shenyang 110034, China

**Abstract** One new species, *Aconias ruficoxalis* sp. nov. (Hymenoptera, Ichneumonidae), collected from Laojieling Natural Preserve, Henan Province, is described. A key to species of *Aconias* is provided. Specimens are deposited in the General Station of Forest Pest management, State Forestry Administration, Shenyang, China.

*Aconias ruficoxalis* sp. nov. (Figs 1-4)

♀ Body length 3.5-7.5 mm. Forewing length 3.0-6.5 mm. Ovipositor sheath length 1.3-2.5 mm. Face 2.2 times as wide as long. Malar space about as

词源: 新种名源于本种基节褐色。

新种与针棘附姬蜂 *A. spinularis* Cameron 近似, 可通过颜面及前胸背板大部分红褐色及基节颜色区别。也可通过上述的检索表区别于本属其它种。

致谢 申效诚研究员提供部分标本, D. S. Yu 博士赠送部分鉴定用的资料, 在此深表谢意。

## REFERENCES (参考文献)

- Cameron, P. 1904. Descriptions of new genera and species of Ichneumonidae from India. (Hym.). *Zeitschrift für Systematische Hymenopterologie und Dipterologie*, 4: 337-347.
- Jonaitis, V. P. 1981. A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera, Ichneumonidae. Subfam. Gelinae (Cryptinae). *Opredeliteli Faune SSSR*, 129: 175-274.
- Meyer, N. F. 1933. Tables systematiques des hymenopteres parasites (Fam. Ichneumonidae) de l'URSS et des pays limitrophes. Vol. 2. Cryptinae. Leningrad. 325 pp.
- Sheng, M L and Sun, S P 2007. Discovery of the genus *Lamachus* Förster (Hymenoptera: Ichneumonidae) in China with description of a new species. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 32: 959-961. [盛茂领, 孙淑萍, 2007. 中国发现侵姬蜂属(膜翅目: 姬蜂科)及一新种. 动物分类学报, 32: 959~961]
- Sheng, M L 2008. Species of the genus *Telautaea* Förster (Hymenoptera, Ichneumonidae) in China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 33 (1): 164-169. [盛茂领, 2008. 中国的特姬蜂属种类记述(膜翅目, 姬蜂科). 动物分类学报, 33 (1): 164~169]
- Sheng, M L and Schönlitzer, K. 2008. The genus *Barytarbes* Förster (Hymenoptera, Ichneumonidae) in China with description of a new species. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 33 (2): 355-359. [盛茂领, Schönlitzer, K. 2008. 霸姬蜂属(膜翅目, 姬蜂科)一新种. 动物分类学报, 33 (2): 391~394]
- Townes, H. K. 1970. The genera of Ichneumonidae, Part 2. *Memoirs of the American Entomological Institute*, 12 (1969): 1-537.
- Uchida, T. 1936. Erster Nachtrag zur Ichneumonidenfauna der Kurilen. (Subfam. Cryptinae und Pimplinae). *Insecta Matsumurana*, 11: 39-55.
- Uchida, T. 1952. Einige neue oder wenig bekannte Ichneumonidenarten aus Japan. *Insecta Matsumurana*, 18 (1-2): 18-24.
- Yu, D. S. and Horstmann, K. 1997. A catalogue of world Ichneumonidae (Hymenoptera). *Memoirs of the American Entomological Institute*, 58: 1-1558.

long as the basal width of mandible. Postocellar line about 0.8 times as long as ocular ocellar line. Flagellum with 21-22 segments. Occipital carina complete. Without notauli. Mesopleuron with dense oblique transverse wrinkles. Prepectus slightly rough, unclearly punctate. Nervulus opposite or slightly distad of basal vein. Nervellus intercepted at lower 0.25. First tergite narrow and long, 2.2 times as long as its apical width, without median dorsal carina, dorsolateral carina complete.

Black. Flagellum 7 (8) - 11 white. Face, clypeus, mandibles (except teeth), maxillary palpi, labial palpi,

front portion of pronotum, tegulae, scutellum, legs, abdominal tergites reddish brown to puce. Stigmata brown.

♂ Body length 5.5-10.0 mm. Forewing length 4.7-8.5 mm. Antenna about as long as body. Flagellum with 28-33 segments. Tyloids in the form of elliptic tubercles, on flagellar segment (13) 14 to (19) 21, the tyloids gradually diminishing in size toward apical end of the series. Hind tarsi 2 to 4 whitish yellow.

Holotype ♀, Laojiling Natural Preserve, Xixia, Henan Province (33.6°N, 111.6°E; alt. 1550 m), 17 July 1998, SHENG Mao Ling. Paratypes: 4♀ ♀, 1 ♂, 18 July 1998, SHENG Mao Ling and SUN Shu Ping, same data as holotype, except 18 July 1998; 1 ♂, Baiyunshan Natural Preserve, Songxian, Henan Province, 1300 m, 16 July 1996, SHEN Xiao Cheng.

Etymology. The name of the new species is based

**Key words** Hymenoptera, Ichneumonidae, *Aonias*, new species.

on its brown coxae.

This new species can be distinguished from others of the genus *Aonias* Cameron, 1904 by the following key.

- Key to species of genus *Aonias* Cameron (♀) in the world**
- 1. Hind tarsus with white ring ..... 2  
Hind tarsus without white ring ..... 3
  - 2. Face black. Hind tibia black with light brown base .....  
..... *A. albitarsis* (Uchida)  
Face white. Hind tibia red with black apex .....  
..... *A. tarsatus* (Bridgman)
  - 3. Abdominal tergites black. Coxae black .....  
..... *A. concavopropodeonus* (Uchida)  
Abdominal tergites, at least apical half, brown or reddish brown. Coxae brown or black ..... 4
  - 4. Face, pronotum, stigmata, coxae and trochanters black .....  
..... *A. spinitarsis* Cameron  
Face and most portion of pronotum reddish brown. Stigmata, coxae (except basal half of ventral side of hind coxa brownish black) and trochanters brown ..... *A. ruficoxalis* sp. nov.